

hunc scopulum uitaueris, & in uiris quoque abstineris à tunica uasa seminaria inuoluen-
 musculum uersus medium abdominis promptissime duces. Ceterum ubi ad mediam usque
 recti musculi amplitudinem peruentum erit, pertinacius cum ascendente musculo tendine, obli-
 qui descendente tendendo coire uidebitur, quem ut integrum, & non uulneratum lacerum ue ad
 lineam (quæ in abdominis medio ambientibus merito, quod illi nulla subest caro, candidior
 apparet) disseces, impossibile arbitror, utcunque acuta nonacula usus fueris, nam retusiori nihil
 prorsus promouebis. Quamobrem reflexo pendenteq; à media recti musculi amplitudine pri-
 mo abdominis musculo, ascendente, qui secundus est, similiter aggredieris, ducta nimirum
 à pubis osse, per superiorem illum ossis regionem, & lumborum uertebras, & fines quatuor in-
 feriorum costarum sectione, quæ ab his omnibus musculum separare possit, & ab illo etiam re-
 spirationis musculo abstineat, qui decimæ & undecimæ costæ potissimum inseritur. Post sectio-
 nem, musculi huius principia hamulo aut unguibus attolles, & à transuerso, cui insidet, in pri-
 ora procedens liberabis. Quod usq; ad exteriorem costam, latus uerè recti musculi eius lateris,
 cuius sectionem administras, mediocri negotio perferes, si modò in uiris uasorum semina-
 lium tunica (quæ ad testium musculorum sectionem seruandæ sunt) animum adhibeas, ne un-
 etiam illæ præscindantur. Vbi uerò recti musculi latus externum membranofus oblique ascen-
 dentis musculi tendo spectat, acutiori nouacula separandus est, neque id quidem oscitanter, ne
 totum obliqui musculi tendinē pertundas, ipsumq; hinc finire arbitreris. Tantus enim huius ten-
 dinis cum transuersi musculi neruosa exilitate iuxta externum recti musculi latus, occurrit nexus,
 ut aliquando obliqui ascendente tendinē diuidi putauerim, & unam ipsius partem transuerso
 musculo conatam, sub rectis musculis procedere, altera uerò super rectos expadi arbitratus fue-
 rim, atque id potissimum supra umbilici regionē est cōspectus. Verum si ad amussim oblique
 ascendente tendinē à transuerso liberaueris, recto musculo illum supersterni cōperies, à quo
 ad albam usq; abdominis lineam accuratè separandus uenit, quod in carnosus recti musculi par-
 tibus factum est promptissimū, at in neruosis illis recti musculi inscriptionibus arduum esse ob-
 seruabis. Obliquorum enim tendo pertinacius in his recto musculo, quam in reliquis sedibus,
 ubi carnosus est, cōnascitur, neq; adeò promptè ab illis examussim discindit, aut potius eradit.
 Hic modò doceberis, qui ascendente descendenteq; tendines, circa abdominis mediū inuicem
 connascantur, ubi recti musculi medietate amplitudini (quæ interior est) in cumbunt, & arduè, nec
 nisi maxima industria, & acutiori nouacula, ad albam usq; abdominis lineam separari queunt.
 Ceterum posteaquam unius lateris, cuius iam sectionē aggredieris, obliquos abdominis muscu-
 los ad albam usq; lineam perduxeris, expende, qualiter obliquorum tendines, rursus transuer-
 sorum tenuitatibus in ea abdominis regione adnascantur, quæ recti musculi ab inuicem magis
 sciunguntur. Vtroq; obliquo musculo in illud cadaueris latus, quod mensē in cubit pendere, sola
 manu rectum musculum à transuersi neruea tenuitate separabis, dextræ manus digitis ab exte-
 riori musculi latere iniectis, & secundum abdominis longitudinē hinc inde sub musculo ductis.
 Quū primum rectus musculus à transuerso abscellit, integrum est, recti musculi fibras unā cum
 transuersis illis inscriptionibus contueri, ac tandem musculum à thorace nouacula liberaui, ab
 abdomine detrahē, ita tamen, ut adhuc pubis ossi hæreat, ipsiusq; hinc initium accuratè exami-
 nes. At quū hunc à pectore in cane, aut simia adimes, studendū est, ne continuū illi membra-
 neū tendinē simul auferas, aut uulneres, qui secundum pectoris longitudinē, à recto musculo,
 ad primā thoracis costam porrigitur, ac reuera in eiusmodi animantibus recti pars esse conspi-
 citur. Est autē hic tendo musculus ue, à quo in musculi brachiū pectori adducere administra-
 tione præcepti quoq; abstinentum, & num homines hunc cum simijs cōmunem habeant in da-
 gandū. Transuersum parī modo, quo obliquos aggressus es, opportunè administrabis, ducta
 similiter leui sectione à pubis osse, per ilium os, & transuersos uertebrarū lumborū processus,
 aut potius musculorū dorsum hic mouentū exterius latus, atq; demū ad fines spuriarum co-
 starum, quæ intacto peritonæo solū musculū penetret. Mox transuersi principia hamulo eleua-
 bis, et nouacula, quam poteris, attentissime à peritonæo paulatim liberabis, donec ad neruosam
 ipsius deueneris exilitatē, quæ maiori adhibita cura, à peritonæo ita separanda est, ut neq; perito-
 næum, neq; tendo, neruosa ue ea tenuitas laceretur. quod quidem nō adeò arduū est, atq; ope-
 rosum, & precipue iuxta abdominis elatiora nō procul à pectore, nam in sumine tendo ipse (ut
 etiā peritonæū) nimis quā tenuis occurrit. Nunc uerò ubi & hunc musculū ad mediū abdo-
 minis perduxeris, ac à peritonæo, ut licuit, optime liberaueris, rursus in suum locū quatuor hu-
 ius lateris musculos repones. Mox cadauere in dorsum reflexo, secundā administrandi rationē
 aggredieris, quæ à tendinum finibus, in abdominis medio auspicatur. Duces itaq; à pectoris
 osse ad pubem usq; per totam abdominis longitudinē, super mediū recti musculi eius lateris,
 cuius

Candidior in
 abdomine li-
 nea.
 Obliqui ascen-
 dentis.

Nexus ner-
 uosa tenuita-
 tis oblique a-
 scen-musculi cum
 transuerso.

Recti admi-
 nistratio.

Transuersi.

Altera abdo-
 minis musculo-
 rum admini-
 stratio, uerfus
 ipsorum in-
 tida.
 Obliqui descen-
 dentis.

cuius administrationem moliris, adeò leuem sectionem
 musculi tendinē penetret. Atque hanc sectionem ac-
 tandam scribo, quod nolle frustra per albam lineam
 sectionem experiri, siquidem impossibile arbitror de
 illa quoq; ascendente tendine, seorsum liberare, qu-
 nem inchoari nō improbaui, utcunque etiam lac-
 propter hac illa ue sectione ducta, adniteris hamulo d-
 eto ipsi musculo nouacula dissecare, quousq; uniuersu-
 que liberatum deduxeris. post hunc, ascendente ten-
 rationis ab alba linea exorsus. In hoc opere rursus in-
 musculi inscriptionibus adnascatur, ac cum neruosa
 recti musculi latus coalescat. Insuper à reliqua transu-
 auelles ipsum à pubis & coxendicis & ilium ossibus,
 rum usque uertebrarum spinas absecans. Rectum sin-
 uerso musculo attolles, & ipsius capite à pubis osse ab-
 do recta sectione secundum albæ lineæ longitudinē c-
 musculi tenuitatem illa peritonæo diuidat, conab-
 quod quidem in homine, & potissimum iuxta pube-
 etur es difficillimè, in porcis autem minimo nego-
 usque ad carneam ipsius regionem à peritonæo, liber-
 uniuersus musculus à peritonæo dissectus pendeat.
 musculos in pristinum locum reponere, & ad amussim
 etus examinare, ac demum resecis illis, ad testium mu-

DE VIRILIVM TESTIVM bris uteri musculis. Caput

LICVISSET huc aliquot Quinti libri
 musculorū natura utcunq; peti posset, uerum ne eas de-
 hic tantum adijcimus, in quibusnam figuris præsentem
 musculus, nōnihil spectatur tertia tabula ad 1. & uig-
 ri autem musculosa substantia eiusdem Libri uigesim-
 ripotuit, exprimitur.



AM tempestiuum est, ad muscu-
 lentium inspectionem, peritona-
 testium musculos aggredi. Periti-
 guli musculi graciles admodum
 efformati, quæ à peritonæo prin-
 net. Hæc enim in posteriori ipsi
 longis, ac inuicē sibi proximis, c-
 gracilis oblongiq; musculi naturam expriment, qui i-
 protenditur, ac tandem iuxta infimā testis sedem, un-
 tatur, quod à testibus iam paratum semen assumit, idē
 ducens, in uescicæ ceruicem se profundit. Neq; aliqua
 sis tunica illa pertinaciter adnascitur, quam ubi simul
 onem ad eius uasis inflexum molitur, qui ad infimam
 ipse nusquam testem contingat. Responder itaq; testis
 efformantur, quandoquidem is aliud nihil prorsus e-
 lium, & testis inuolucro innata, quemadmodum cari-
 que fibris per membranam digestis constituuntur. P-
 arbitrario motu testis modice (ut & ipsi musculi gr-
 testes plus æquo laxati, ac ad anteriora pendentes, ni-
 sum musculi in coitu potissimum præstant, si enim te-
 atque hæc ad inferiora protracta perpetuò arcarentur
 rent, atque modò, quū testium à musculis iam attracto
 Constat itaq; musculos hos (qui nequeatōdō Græcis u-